


DATABLAD

Version: 05.10.2022

EP100i er et tilskudsfoder fremstillet af rapsskrå fermenteret med mælkesyrebakterier. EP100i indeholder fermenteringsprodukter, herunder organiske syrer primært mælkesyre, samt tarmflorastabiliserende mælkesyrebakterier. Fermenteringsprocessen gør EP100i velegnet til at holde mave-tarmkanalen sund og velfungerende.

EP100i kan anvendes som diætisk tilskud i op til fire uger til at stabilisere den fysiologiske fordøjelse, hvis der foreligger risiko for fordøjelsesforstyrrelser, i perioder med fordøjelsesforstyrrelser eller under rekonvalescens fra fordøjelsesforstyrrelser (diarré)*. EP100i tilsættes med en maksimal iblanding på 20% af fuldfoderet.



NÆRINGSSTOFFER

Tørstof	890 g/kg
Råprotein	340 g/kg
Råfedt	38 g/kg
Råfibre	118 g/kg
Råaske	70 g/kg
Sukker	32 g/kg

ENERGI

EFOSi	60 %
EFOS	79 %
FEsv	73,9 pr. 100 kg
FEso	80,3 pr. 100 kg
ME Æglæggere	7,3 MJ/kg

PROTEINVÆRDI

St. Ford. råprotein, smågrise	256 g/kg
St. Ford. råprotein, slagtesvin	279 g/kg

MÆLKESYRE OG BAKTERIER

Mælkesyre	55 g/kg
Mælkesyrebakterier**	>10 ⁶ cfu/g

*Det anbefales at indhente råd fra en dyrlæge inden brug eller forlængelse af brugsperioden.

** Enterococcus faecium (NCIMB 10415)

EP100i er et fermenteret proteinfoder produceret af naturlige non-gmo råvarer. Tallene er gennemsnit af analyseresultater. Mindre forskelle i den kemiske sammensætning kan forekomme.

ST.FORD AMINOSYRER TOTAL GRISE FJERKRÆ

Lys	18,2	14,9	15,7	g/kg
Met	6,5	5,6	6,1	g/kg
M+C	14,5	11,9	12,8	g/kg
Thre	14,6	11,7	12,0	g/kg
Tryp	4,4	3,5	4,0	g/kg
Ile	12,5	10,4	10,8	g/kg
Arg	19,0	16,9	17,1	g/kg
His	9,0	7,7	7,9	g/kg
Leu	23,0	19,3	20,1	g/kg
Val	16,6	13,3	14,2	g/kg
Phen	13,4	11,3	11,7	g/kg
Tyr	10,0	8,3	8,7	g/kg

MINERALER

Calcium	7,5 g/kg
Fosfor	11,0 g/kg
Ford. fosfor	7,2 g/kg
Natrium	0,8 g/kg
Kalium	12,8 g/kg
Klorid	0,4 g/kg

UDSEENDE:

Mørkebrun melvare med en behagelig duft af fermentering.

LEVERINGSFORM:

Bulk eller big bags.

**OPLAGRING & HOLDBARHED
AF NÆRINGSSTOFFER:**

12 måneder fra produktionsdato ved opbevaringstemperatur på 20°C eller derunder. Holdbarheden forkortes ved højere temperatur.

BRUGSANVISNING:

	PERIODE	EP100i I % AF FULDFODER
GRISE		
Søer	Drægtighed	6 %
	Diegivning	9 %
Smågrise	Før og efter fravænning	8-15%
	12-20 kg	8-15%
	20-30 kg	5-10%
Slagtesvin		4-10%
FJERKRÆ		
Æglæggere	Indtil 16 uger	4%
	Æglægningsperiode	5-6%
Kalkuner	Indtil 16 uger	4-5%

Til fravænning uden zink og antibiotika skal EP100i tilsættes med minimum 8%. Produktet indeholder 5,5% mælkesyre, hvilket bør indregnes i den samlede rations indhold af organiske syrer.